Variata S. V. n. s.
 var. Obeliscata Hb. n. s.
Juniperata L. n. s.
Siterata Hufn. z. s.
 Psittacata S. V.
Truncata Hufn. z. h.
 Russata S. V.
Firmata Hb. n. h.
Aptata Hb. s. bei Moabit.
Pectinataria Fuessly n. s.
 Miaria S. V.
Fluctuata L. überall h.
Montanata S. V. überall z. h.
Ligustrata S. V. z. s.
Ferrugata L. überall h.
 ab. Spadicearia S. V. z. h.
Propugnata S. V. n. h.
Fluviata Hb. 1 Ex. Steglitzer Wäldchen (Pfützner).
Gemmata Hb.
Lignata Hb. z. s.
Dilutata S. V. 1 Ex. Jungfernheide.
Picata Hb. s. Finkenkrug.
Galiata S. V. s. Jungfernheide.
Cuculata Hufn. n. h.
 Sinuata S. V.
Albicillata L. z. h.
Hastata L. zuweilen h.
Tristata L. wie vorige.
Biriviata Bkh. überall g.
Rivata Hb. s.
Candidata S. V. zuweilen h.
Luteata S. V. wie vorige.
Obliterata Hufn. z. h.
 Heparata S. V.
Albulata S. V. auf Waldwiesen h.
Decolorata Hb. sparsam.
Bilineata L. fast überall h.
Corylata Thnb. n. s.
 Ruptata Hb.
Impluviata S. V. h.
Berberata S. V. z. s.
Sagittata F., in früheren Jahren n. s.
Chenopodiata S. V., in Gärten n. s.
Polygrammata Bkh. n. s.
Aquata Hb. n. s, bei Moabit.

Eupithecia Curtis.

Piperata Stph. Jungfernheide n. s.
Castigata Hb. s.
Absynthiata L., Brachfelder u. Gärten z s.
Satyrata Hb. h.
Pimpinellata Hb. Jungfernheide s.
Vulgata Hw. in Gärten n. s.
Plumbeolata Hw. h.
 Begrandaria B.
Inturbata Hb. n. h.
Indigata Hb. n. s.
Innotata Hb., auf Feldern h.
Nanata Hb. n. s.
Sobrinata Hb. sparsam.
Rectangulata L. in Gärten n. s.
Debiliata Hb. n. s. bei Treptow.
Subfulvata Hw. z. s.
 Oxydata Tr.
Succenturiata L. z. s. Finkenkrug.
Centaureata S. V. z. s.
Linariata S. V. n. s.

Anmerkungen.

1. *Pap. Podalirius* ist vor mehreren Jahren noch bei Rüdersdorf vorgekommen, auch sind einzelne Raupen dieses Falters in der Hasenheide gefunden worden.

2. *Melitaea Britomartis* Assm. ist nur Varietät von *Parthenie* Bkh. Die weifslichen, etwas glänzenden Flecke auf der Rückseite der Hinterflügel in Zelle 1c, sowie die dunklere Ausfüllung der Saumlinie, welche Merkmale hauptsächlich die Art unterscheiden sollen, sind durchaus nicht constant, vielmehr finden sich bei einer gröfseren Anzahl frischer Exemplare der *Parthenie* Bkh. Uebergänge von einer rein weifsen, mehr oder weniger glänzenden Farbe der Wurzelflecke und Mittelbinde in ein lebhaftes Gelb. Die schwarzen Bogen der Randmonde sind bald schwächer, bald stärker, ebenso erscheint die Ausfüllung der doppelten Saumlinie in mehr oder weniger dunklem Gelb, ist auch oft von der Grundfarbe gar nicht abgetönt. Die Färbung der Palpen endlich variirt oft mit der helleren oder dunkleren Färbung der Exemplare.

3. *Macaria alternata* S. V. ist nur Varietät von *notata* L., da sie durch vollständige Uebergänge in einander verschmelzen.